

大腸癌

レジメン名称	がん腫	1クール	薬剤	標準投与量	単位	投与日	注意が必要な副作用
大腸 AFL+FOLFIRI q2w	大腸癌	2週間	アフリベルセプトベータ (AFL)	4	mg/kg	day1	出血、高血圧 下痢、脱毛、骨髄抑制 口内炎、下痢、皮膚障害 口内炎、下痢、皮膚障害
			レボホリナート(LV)	200	mg/m ²	day1	
			イリノテカン(CPT-11)	150	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル(5FU)	400	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル(5FU)	2400	mg/m ²	day1-3	
大腸 BEV+FOLFIRI q2w	大腸癌	2週間	ベバシズマブ(BEV)	5	mg/kg	day1	出血、高血圧 下痢、脱毛、骨髄抑制 口内炎、下痢、皮膚障害 口内炎、下痢、皮膚障害
			レボホリナート(LV)	200	mg/m ²	day1	
			イリノテカン(CPT-11)	150	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル(5FU)	400	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル(5FU)	2400	mg/m ²	day1-3	
大腸 BEV+FOLFOXIRI q2w	大腸癌	2週間	ベバシズマブ(BEV)	5	mg/kg	day1	出血、高血圧 下痢、脱毛、骨髄抑制 末梢神経障害 口内炎、下痢、皮膚障害 口内炎、下痢、皮膚障害
			レボホリナート(LV)	200	mg/m ²	day1	
			イリノテカン(CPT-11)	165	mg/m ²	day1	
			オキサリプラチン(L-OHP)	85	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル(5FU)	400	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル(5FU)	2400	mg/m ²	day1-3	
大腸 BEV+SOX q3w	大腸癌	3週間	ベバシズマブ (BEV)	7.5	mg/kg	day1	出血、高血圧 末梢神経障害 口内炎、下痢、皮膚障害
			オキサリプラチン(L-OHP)	130	mg/m ²	day1	
			エスワン(S1)	80-120	mg/day	day1-14	
大腸 BEV+XELOX q3w	大腸癌	3週間	ベバシズマブ (BEV)	7.5	mg/kg	day1	出血、高血圧 末梢神経障害 手足症候群
			オキサリプラチン(L-OHP)	130	mg/m ²	day1	
			カペシタビン(cape)	2000	mg/m ²	day1-14	
大腸 BEV+mFOLFOX6 q2w	大腸癌	2週間	ベバシズマブ(BEV)	5	mg/kg	day1	出血、高血圧 末梢神経障害 口内炎、下痢、皮膚障害 口内炎、下痢、皮膚障害
			レボホリナート(LV)	200	mg/m ²	day1	
			オキサリプラチン(L-OHP)	85	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル(5FU)	400	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル(5FU)	2400	mg/m ²	day1-3	
大腸 C-mab+FOLFIRI q2w	大腸癌	2週間	セツキシマブ(C-mab)	500	mg/m ²	day1	皮疹 下痢、脱毛、骨髄抑制 口内炎、下痢、皮膚障害 口内炎、下痢、皮膚障害
			レボホリナート(LV)	200	mg/m ²	day1	
			イリノテカン(CPT-11)	150	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル(5FU)	400	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル(5FU)	2400	mg/m ²	day1-3	

レジメン名称	がん腫	1クール	薬剤	標準投与量	単位	投与日	注意が必要な副作用
大腸 CPT-11 q2w	大腸癌	2週間	イリノテカン(CPT-11)	150	mg/m ²	day1	下痢、脱毛、骨髄抑制
大腸 CapeOX q3w	大腸癌	3週間	オキサリプラチン(L-OHP)	130	mg/m ²	day1	末梢神経障害
			カペシタビン(cape)	2000	mg/m ²	day1-14	手足症候群
大腸 FOLFIRI q2w	大腸癌	2週間	レボホリナート(LV)	200	mg/m ²	day1	
			イリノテカン(CPT-11)	150	mg/m ²	day1	下痢、脱毛、骨髄抑制
			フルオロウラシル(5FU)	400	mg/m ²	day1	口内炎、下痢、皮膚障害
			フルオロウラシル(5FU)	2400	mg/m ²	day1-3	口内炎、下痢、皮膚障害
大腸 P-mab q2w	大腸癌	2週間	パニツムマブ(P-mab)	6	mg/kg	day1	皮疹
大腸 P-mab+FOLFIRI q2w	大腸癌	2週間	パニツムマブ(P-mab)	6	mg/kg	day1	皮疹
			レボホリナート(LV)	200	mg/m ²	day1	
			イリノテカン(CPT-11)	150	mg/m ²	day1	下痢、脱毛、骨髄抑制
			フルオロウラシル(5FU)	400	mg/m ²	day1	口内炎、下痢、皮膚障害
			フルオロウラシル(5FU)	2400	mg/m ²	day1-3	口内炎、下痢、皮膚障害
大腸 P-mab+mFOLFOX6 q2w	大腸癌	2週間	パニツムマブ(P-mab)	6	mg/kg	day1	皮疹
			レボホリナート(LV)	200	mg/m ²	day1	
			オキサリプラチン(L-OHP)	85	mg/m ²	day1	末梢神経障害
			フルオロウラシル(5FU)	400	mg/m ²	day1	口内炎、下痢、皮膚障害
			フルオロウラシル(5FU)	2400	mg/m ²	day1-3	口内炎、下痢、皮膚障害
大腸 RAM+FOLFIRI q2w	大腸癌	2週間	ラムシルマブ(RAM)	8	mg/kg	day1	出血、高血圧
			レボホリナート(LV)	200	mg/m ²	day1	
			イリノテカン(CPT-11)	150	mg/m ²	day1	下痢、脱毛、骨髄抑制
			フルオロウラシル(5FU)	400	mg/m ²	day1	口内炎、下痢、皮膚障害
			フルオロウラシル(5FU)	2400	mg/m ²	day1-3	口内炎、下痢、皮膚障害
大腸 TAS-102+BEV q4w	大腸癌	4週間	ベバシズマブ(BEV)	5	mg/kg	day1.8	出血、高血圧
			トリフルリジン・チピラシル(TAS-102)	35	mg/m ²	day1-5, 8-12	口内炎、下痢、悪心
大腸 mFOLFOX6 q2w	大腸癌	2週間	レボホリナート(LV)	200	mg/m ²	day1	
			オキサリプラチン(L-OHP)	85	mg/m ²	day1	末梢神経障害
			フルオロウラシル(5FU)	400	mg/m ²	day1	口内炎、下痢、皮膚障害
			フルオロウラシル(5FU)	2400	mg/m ²	day1-3	口内炎、下痢、皮膚障害