

## 膀胱癌

レジメン名称	がん腫	1クール	薬剤	標準投与量	単位	投与日	注意が必要な副作用
膀胱 GEM+nab-PTX 3W1R	膀胱癌	4週間	アルブミン懸濁型パクリタキセル(nab-PTX)	125	mg/m <sup>2</sup>	day1.8.15	脱毛、末梢神経障害
			ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/m <sup>2</sup>	day1.8.15	皮疹、血管痛、骨髄抑制
膀胱 mFOLFIRINOX q2w	膀胱癌	2週間	オキサリプラチン(L-OHP)	85	mg/m <sup>2</sup>	day1	末梢神経障害
			レボホリナート(LV)	200	mg/m <sup>2</sup>	day1	
			イリノテカン(CPT-11)	150	mg/m <sup>2</sup>	day1	下痢、脱毛、骨髄抑制
			フルオロウラシル(5FU)	2400	mg/m <sup>2</sup>	day1-3	口内炎、下痢、皮膚障害
膀胱 nal-IRI/LV q2w	膀胱癌	2週間	リポソーマルイリノテカン(nal-IRI)	70	mg/m <sup>2</sup>	day1	下痢、脱毛、骨髄抑制
			レボホリナート(LV)	200	mg/m <sup>2</sup>	day1	
			フルオロウラシル(5FU)	2400	mg/m <sup>2</sup>	day1-3	口内炎、下痢、皮膚障害