

前立腺癌

レジメン名称	がん腫	1クール	薬剤	標準投与量	単位	投与日	注意が必要な副作用
前立腺 CBZ q3w	前立腺癌	3週間	カバジタキセル(CBZ)	20	mg/m ²	day1	骨髄抑制
前立腺 DOC q3w	前立腺癌	3週間	ドセタキセル(DOC)	75	mg/m ²	day1	脱毛、爪障害、浮腫

尿路上皮癌

レジメン名称	がん腫	1クール	薬剤	標準投与量	単位	投与日	注意が必要な副作用
尿路上皮 Nivolumab q2w	尿路上皮癌	2週間	ニボルマブ(Nivo)	240	mg/body	day1	皮膚障害、大腸炎、間質性肺炎、甲状腺機能障害
尿路上皮 pembrolizumab q3w	尿路上皮癌	3週間	ペムブロリズマブ(pembrolizumab)	200	mg/body	day1	皮膚障害、大腸炎、間質性肺炎、甲状腺機能障害

腎細胞癌

レジメン名称	がん腫	1クール	薬剤	標準投与量	単位	投与日	注意が必要な副作用
腎細胞 Nivolumab q2w	腎細胞癌	2週間	ニボルマブ(Nivo)	240	mg/body	day1	皮膚障害、大腸炎、間質性肺炎、甲状腺機能障害
腎細胞 pembrolizumab q3w	腎細胞癌	2週間	ペムブロリズマブ(pembrolizumab)	200	mg/body	day1	皮膚障害、大腸炎、間質性肺炎、甲状腺機能障害