

胃癌

レジメン名称	がん腫	1クール	薬剤	標準投与量	単位	投与日	注意が必要な副作用
胃 Nivo+SOX q3w	胃癌	3週間	ニボルマブ(Nivo)	360	mg/body	day1	皮膚障害、大腸炎、間質性肺炎、甲状腺機能障害 末梢神経障害
			オキサリプラチン(L-OHP)	100	mg/m ²	day1	
			エスワン(S1)	80-120	mg/day	day1-14	
胃 Nivolumab q2w	胃癌	2週間	ニボルマブ(Nivo)	240	mg/body	day1	皮膚障害、大腸炎、間質性肺炎、甲状腺機能障害
胃 PTX 3W1R	胃癌	4週間	パクリタキセル(PTX)	80	mg/m ²	day1.8.15	脱毛、末梢神経障害
胃 S-1+DOC q3w	胃癌	3週間	ドセタキセル(DOC)	40	mg/m ²	day1	脱毛、爪障害、浮腫
			エスワン(S1)	80-120	mg/day	day1-14	口内炎、下痢、皮膚障害
胃 SOX q3w	胃癌	3週間	オキサリプラチン(L-OHP)	100	mg/m ²	day1	末梢神経障害
			エスワン(S1)	80-120	mg/day	day1-14	口内炎、下痢、皮膚障害
胃 nab-PTX 3W1R	胃癌	4週間	アルブミン懸濁型パクリタキセル(nab-PTX)	80	mg/day	day1.8.15	脱毛、末梢神経障害
胃 weekly-PTX+RAM	胃癌	4週間	パクリタキセル(PTX)	80	mg/m ²	day1.8.15	脱毛、末梢神経障害
			ラムシルマブ(RAM)	8	mg/kg	day1.15	出血、高血圧
胃 weekly-nab-PTX+RAM	胃癌	4週間	アルブミン懸濁型パクリタキセル(nab-PTX)	100	mg/m ²	day1.8.15	脱毛、末梢神経障害
			ラムシルマブ(RAM)	8	mg/kg	day1.15	出血、高血圧