

肺癌

レジメン名称	がん腫	1クール	薬剤	標準投与量	単位	投与日	注意が必要な副作用
肺 AMR(day1-3) q3w	肺癌	3週間	アムルビシン(AMR)	40	mg/m ²	day1.2.3	悪心、脱毛、骨髄抑制
肺 VNR 2W1R	肺癌	3週間	ビノレルビン(VNR)	25	mg/m ²	day1.8	脱毛、末梢神経障害
肺 atezo+CDBCA+VP-16 q3w	肺癌	3週間	アテゾリズマブ(atezo)	1200	mg/body	day1	皮膚障害、大腸炎、間質性肺炎、甲状腺機能障害 悪心、血小板減少 脱毛
			カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	day1	
			エトポシド(VP-16)	100	mg/m ²	day1.2.3	
肺 atezo + CBDCA+PTX+BEV q3w	肺癌	3週間	アテゾリズマブ(atezo)	1200	mg/body	day1	皮膚障害、大腸炎、間質性肺炎、甲状腺機能障害 悪心、血小板減少 脱毛、末梢神経障害 出血、高血圧
			カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	day1	
			パクリタキセル(PTX)	175	mg/m ²	day1	
			ベバシズマブ(BEV)	15	mg/kg	day1	
肺 pembro+CBDCA+nab-PTX q3w	肺癌	3週間	ペムブロリズマブ(pembrolizumab)	200	mg/body	day1	皮膚障害、大腸炎、間質性肺炎、甲状腺機能障害 悪心、血小板減少 脱毛、末梢神経障害
			カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	day1	
			アルブミン懸濁型パクリタキセル(nab-PTX)	100	mg/m ²	day1	
肺 pembro+PEM q3w	肺癌	3週間	ペムブロリズマブ(pembrolizumab)	200	mg/body	day1	皮膚障害、大腸炎、間質性肺炎、甲状腺機能障害 皮疹、骨髄抑制
			ペメトレキセド(PEM)	500	mg/m ²	day1	
肺 pembro+PEM+CBDCA q3w	肺癌	3週間	ペムブロリズマブ(pembrolizumab)	200	mg/body	day1	皮膚障害、大腸炎、間質性肺炎、甲状腺機能障害 皮疹、骨髄抑制 悪心、血小板減少
			ペメトレキセド(PEM)	500	mg/m ²	day1	
			カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	day1	
肺 pembrolizumab q3w	肺癌	3週間	ペムブロリズマブ	200	mg/body	day1	皮膚障害、大腸炎、間質性肺炎、甲状腺機能障害