

乳癌

レジメン名称	がん腫	1クール	薬剤	標準投与量	単位	投与日	注意が必要な副作用
乳 AC q3w	乳癌	3週間	ドキシソルビシン(ADM)	60	mg/m ²	day1	悪心、脱毛
			シクロホファミド(CPA)	500	mg/m ²	day1	悪心、出血性膀胱炎
乳 CAF q3w	乳癌	3週間	ドキシソルビシン(ADM)	50	mg/m ²	day1	悪心、脱毛
			シクロホファミド(CPA)	500	mg/m ²	day1	悪心、出血性膀胱炎
			フルオロウラシル(5FU)	500	mg/m ²	day1	口内炎、下痢
乳 DOC q3w	乳癌	3週間	ドセタキセル(DOC)	60	mg/m ²	day1	脱毛、爪障害、浮腫
乳 DOC+CPA q3w	乳癌	3週間	ドセタキセル(DOC)	75	mg/m ²	day1	脱毛、爪障害、浮腫
			シクロホファミド(CPA)	600	mg/m ²	day1	悪心、出血性膀胱炎
乳 EC q3w	乳癌	3週間	エピルビシン(EPI)	90	mg/m ²	day1	悪心、脱毛
			シクロホファミド(CPA)	600	mg/m ²	day1	悪心、出血性膀胱炎
乳 Eribulin 2W1R	乳癌	3週間	エリブリン(Eribulin)	1.4	mg/m ²	day1.8	骨髄抑制、肝障害
乳 FEC100 q3w	乳癌	3週間	エピルビシン(EPI)	100	mg/m ²	day1	悪心、脱毛
			フルオロウラシル(5FU)	500	mg/m ²	day1	口内炎、下痢
			シクロホファミド(CPA)	500	mg/m ²	day1	悪心、出血性膀胱炎
乳 GEM 2W1R	乳癌	3週間	ゲムシタビン(GEM)	1250	mg/m ²	day1.8	皮疹、血管痛、骨髄抑制
乳 T-mab q3w	乳癌	3週間	トラスツズマブ(T-mab)	初回:8	mg/kg	day1	心毒性
				2回目以降:6			
乳 T-mab+PER q3w	乳癌	3週間	トラスツズマブ(T-mab)	初回:8	mg/kg	day1	心毒性
				2回目以降:6			
			ペルツズマブ(PER)	初回:840	mg/body	day1	心毒性
2回目以降:420							
乳 TDM-1 q3w	乳癌	3週間	トラスツズマブ イムタツツ(TDM-1)	3.6	mg/kg	day1	脱毛、末梢神経障害
乳 VNR 2W1R	乳癌	3週間	ビノレルビン(VNR)	25	mg/m ²	day1.8	脱毛、末梢神経障害
乳 atezo+nab-PTX 3W1R	乳癌	4週間	アテゾリズマブ(atezo)	1200	mg/body	day1.8	皮膚障害、大腸炎、間質性肺炎、甲状腺機能障害
			アルブミン懸濁型パクリタキセル(nab-PTX)	100	mg/m ²	day1.8.15	脱毛、末梢神経障害
乳 nab-PTX+BEV 3W1R	乳癌	4週間	アルブミン懸濁型パクリタキセル(nab-PTX)	100	mg/m ²	day1.8.15	脱毛、末梢神経障害
			ベバシズマブ(BEV)	10	mg/kg	day1.8	出血、高血圧
乳 wPTX+BEV 3W1R	乳癌	4週間	パクリタキセル(PTX)	80	mg/m ²	day1.8.15	脱毛、末梢神経障害
			ベバシズマブ(BEV)	10	mg/kg	day1.8	出血、高血圧
乳 weekly-PTX	乳癌	8週間	パクリタキセル(PTX)	80	mg/m ²	day1.8.15.22.36	脱毛、末梢神経障害